

日常生活

分析止痛藥


醫藥衛生

組員：

50520 王巧穎

50526 林品好

50708 邱柏睿



目錄



動機&目的



藥物分析 & 介紹



藥品禁忌



結果



心得

動機 & 目的

[Back to Agenda Page](#)

我們這次選擇研究止痛藥的原因是，人們常因為身體上的疼痛，或者是不舒服的時候，我們常常都會服用止痛藥來緩解身體上不適。但在種類繁多的止痛藥商品，我們要如何挑選適合我們的止痛藥也是十分重要的一項課題。所以我們藉由這次的時間，來分析這種止痛藥的功用和適合用在什麼時候，或是哪些藥不適合在什麼時候使用。



普拿疼

用來鎮熱解痛，也被用來治療頭痛、肌肉酸痛、關節炎、背痛、牙痛、感冒、發燒等多種症狀

肚子痛不適合吃普拿疼！


非類固醇消炎止痛藥可能會破壞胃壁粘膜的保護作用，若服用不當恐加重腸胃道的傷害



EVE止痛藥

適用於頭痛，肩膀疼痛，牙痛，經痛（生理痛），喉嚨痛，關節痛，肌肉痛，神經痛，腰痛，拔牙後的疼痛，挫傷疼痛，耳痛，骨折疼痛，扭傷疼痛，外傷疼痛等症狀的鎮痛

內涵少量氧化美（保護腸胃不刺激）
適合胃痛、肚子痛、生理痛



理冒伯樂止痛錠

可適用於退燒、止痛像是 (緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)



服用此藥物可能會有副作用，像是胃腸道的不適、厭食、噁心、嘔吐和臉色蒼白等症狀

止痛藥介紹

相關止痛藥藥品的成分和服用禁忌

藥品

普拿疼

有效成分及含量：
Acetaminophen(乙醯胺酚)500毫克及Caffeine(咖啡因)65毫克。
其他成分(賦形劑)：
Starch Pregelatinised、
Calcium Carbonate、
Alginic Acid、 Purified Water、
Crospovidone、
Povidone、 Opadry White YS-1-7003、
Sodium Parabens
Magnesium Stearate
Carnauba Wax

EVE止痛藥

主成分為
Ibuprofen, 劑量
150-200毫克不
等, 其中EVE-A、
EVE-EX、 QUICK、
QUICK-DX系列
中, 含有
Allylisopropylacetylu
rea鎮定劑成分

理冒伯樂止痛錠

有效成分及含量：每錠中含：
Acetaminophen 500mg
1.2 其他成分(賦形劑)
Hydroxypropylcellulose
、
Polyvinylpyrrolidone、
Polyethyleneglycol
6000、 Sodium starch
glycolate、 Magnesium
Stearate、 Magnesium
Aluminosilicate、
Tartrazine。

成分分析

	普拿疼	EVE	理冒伯樂
布洛芬		150mg	
乙烯安芬	500mg		500mg
脫水咖啡因	65mg	80mg	
鎮靜劑		60mg	

藥品種類 介紹

止痛藥種類	Acetaminophen (乙醯胺酚類)	NSAIDs (非類固醇消炎止痛類)	Opioid (鴉片類)
藥物機轉	作用於中樞神經，以阻斷中樞神經訊號來消除疼痛的感覺	以抑制cyclooxygenase(COX)，使花生四烯酸無法代謝成前列腺素、前列環素、血栓素，達到止痛、抗發炎、退燒效果	作用於中樞神經，麻醉鎮靜止痛藥具成癮性，被列為管制藥品
市面上商品	常見於一般止痛藥、綜合感冒藥、感冒糖漿 台灣： 普拿疼系列、斯斯感冒膠囊、明通治痛丹、傷風友、風熱友、克風邪、國安、友露安等 日本： 新ルル-A錠系列、百保能黃金微粒、BUFFERIN、TYLENOL	台灣： 痠痛貼布 (常含有Diclofenac或Indomethacin成分) 日本： EVE系列、BUFFERIN Premium BUFFERIN Luna	屬管制藥，需有處方籤才可以領用，如 <ul style="list-style-type: none"> • codeine • Ultracet(tramadol37.5mg+acetaminophen325mg) • meperidine(Demerol) • Tramadol • morphine • fentanyl
誰會用	一般的頭痛、喉嚨痛、牙痛 肌肉痠痛、經痛、發燒	運動員(緩解運動後的肌肉發炎) 關節炎患者(同時止痛又消炎) 中重度經痛(抑制造成經痛的前列腺素，以及mefenamic會減緩子宮收縮的效果)	對NSAIDs類無效的 重度疼痛者、癌症病患
副作用	肝毒性	明顯的胃腸道副作用可能會 胃腸道不適、胃痛、胃潰瘍 胃出血都有可能	鎮靜、噁心、呼吸抑制、便秘
備註	每日飲酒習慣者要避免長期使用 會增加肝毒性 成人劑量： 500mg/次，一天不可超過4000mg	會抑制卵泡內前列腺素製造 因而無法順利破卵，且干擾 到胚胎著床	在有些國家裡被列為禁藥

藥品使用禁忌

中化健康360®

一天不能超過
4000mg

常見的綜合感冒藥
或其他消炎止痛藥
品中也可能含有乙
醯胺酚

不可以
搭配**酒精**服用

服用過量初期
可能會出現：
胃腸不適、厭食、
噁心、嘔吐、蒼白
及出汗...等症狀




服用過量嚴重
可能會出現：
肝臟受損、低血糖
昏迷、腎小管壞死

服用過量後就算當
下無不適症狀也要
立即就醫

購買止痛藥或服用
前，請告知醫藥師
目前有在服用的藥
物，避免劑量重複

不可以因想要得到
更強的緩解效果而
超過建議服用量



普拿疼

禁忌。

EVE

禁忌。

理冒伯樂

禁忌。

禁用年齡

12歲以下


15歲以下

3歲以下

1. 不可過量不可飲酒
咖啡肝腎功能不好請
示醫生評估
2. 避免和綜合感冒藥
一起使用

1. 有造成血小板低下的
風險。
2. 嗜睡 故開車和操作
機械不可使用


成人不得連續服用本類製劑
超過7天，小孩不得超過3天



曾因藥物成分過敏者皆不可使用

心得

經過這次的自主學習的機會，讓我們了解到了不同的止痛藥的用途。在身體不舒服時我們經常會使用止痛藥來緩解不適，但止痛藥只是一個統稱，在常見的藥物品項中，其實不同的止痛藥是有著不同的功用。所以藉由這次的自主學習，我們了解到了各種廠牌的止痛藥的不同用途、功效和各種藥品的禁忌等等。也可以讓我們未來在選擇藥品的時候，可以更知道哪些藥品的功用，讓我們可以更好的對症下藥。



謝謝大家